

DEFINIZIONE - EPIDEMIOLOGIA

Lesione o Piaga o Ulcera da Decubito o da Pressione.
Assumiamo la dizione "Lesione da Decubito". Abbreviazione: LdD

E' definita lesione da decubito un'area localizzata di danno della cute e dei tessuti sottocutanei, con evoluzione necrotica, conseguenza diretta di forze di pressione, trazione e frizione o da una combinazione di questi fattori, in pazienti predisposti in seguito a precarie condizioni generali.

EPIDEMIOLOGIA

In Italia nel 1984 uno studio effettuato su 20 ospedali, per un totale di 12.048 pazienti, dei reparti di medicina, chirurgia, neurologia, geriatria, neurochirurgia, rianimazione e urologia, mostrava una prevalenza dell'8.6%.⁽¹⁾

Rilevazioni effettuate in ospedali italiani hanno evidenziato che la prevalenza di LdD tende ad aumentare con il passare degli anni: dall'8,6% rilevato nel 1984 al 12,8% rilevato nel 1996.⁽²⁾

La prevalenza aumenta in modo esponenziale con l'avanzare dell'età e su questo dato sono concordi tutti gli studi osservazionali. Uno studio condotto nella nostra ASL 7 su una popolazione di pazienti con LCC, rivelava una prevalenza di circa il 50% nella fascia di età superiore agli 80 anni.⁽³⁾

Sull'analisi dei costi esiste una fitta letteratura in merito. Si riporta un dato significativo: una LdD che richiede un intervento infermieristico domiciliare per 3-4 mesi di un ora al giorno, con necessità di utilizzare materiale di medicazione, costa 10-12 milioni di vecchie lire.⁽⁴⁾