

DIAGNOSI

Per fare una ipotesi diagnostica è sufficiente una accurata anamnesi clinica del paziente e degli arti inferiori.

L'utilizzo dell'ecodoppler è di importanza fondamentale per identificare il grado di interessamento della patologia, il segmento interessato, l'eventuale presenza di TVP (trombosi venosa profonda).

Diagnosi clinica di varici vicarie: Prova di Perthes.

In ortostatismo si applica un laccio poco sopra il ginocchio in modo da interrompere il circolo superficiale e si fa quindi deambulare il paziente; lo svuotamento delle vene superficiali testimonierà la pervietà del sistema profondo e la continenza delle perforanti; l'aumento del turgore delle varici sarà indice di un difficoltoso scarico venoso (per ostruzione persistente o per sovraccarico da reflusso, come nelle sindromi post-trombotiche da ricanalizzazione) e l'incontinenza delle perforanti.

Diagnosi strumentale

Importante eseguire un Ecodoppler per differenziare le ostruzioni permanenti, recenti e vecchie, le ricanalizzazioni così come gli eventuali trombi flottanti endoluminali. La diagnosi ecografia di TVP si basa sul binomio Dilatazione – Incompressibilità della vena interessata.

Sintomatologia flebostatica sopraggiunge spesso in assenza di alterazione organica del sistema venoso.

- Senso di peso ortostatico
- Sub-edema serotino
- Crampi notturni
- Dermatite da stasi

Descrizione della lesione

Se si vuole giungere ad una corretta diagnosi etiologica, in presenza di una lesione cutanea cronica, è importante tener presente quali sono le caratteristiche morfologiche.

| VENOSA | |
|------------------|---|
| CUTE | CALDA, ESITI CICATRIZIALI, ATROFIA BIANCA, DERMOIPODERMITE LIPOSCLEROTICA |
| FORMA | ROTONDEGGIANTE, OVALE |
| NUMERO | SOLITAMENTE È UNICA, DIMENSIONI VARIABILI |
| SEDE | III MEDIO-INF INTERNO DELLA GAMBA DI UNO OD ENTRAMBI GLI ARTI |
| MARGINI | IRREGOLARI |
| ESSUDATO | MEDIO, ABBONDANTE |
| DISCROMIE | FIAMMA BRUNA DA DEPOSITO DI EMOSIDERINA |
| EDEMA | GRADO MODERATO O GRAVE |
| FONDO | FIBRINA, GRANULAZIONE, NECROSI, COLONIZZAZIONE A SECONDA DELLA FASE |
| DOLORE | DOLORE PRESENTE PER CAUSE SECONDARIE (FLEBITE, COLONIZZAZIONE, EDEMA) |